

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。  
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

漢方製剤  
ニタンダ よく い にん とう 薏苡仁湯エキス顆粒

第2類医薬品

関節、筋肉の痛みをとる漢方「薏苡仁湯」を製剤化したものです。関節痛、筋肉痛は、日本人が昔から悩まされている病気の1つです。

関節痛は、しばしば発熱を伴い、急に寒気がして多量の汗をかき、なんとなく不安な状態になるものです。また骨、筋肉、関節に強い痛みとこわばりを生ずる病気です。

ニタンダ薏苡仁湯エキス顆粒は、発汗・利尿作用により水分代謝を促進し、また血行を良くし、関節、筋肉のはれをとり、痛みをとる漢方製剤です。

また、本剤中に薏苡仁湯エキスが、現在厚生労働省で認められている最大量配合されています。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 〈成分・分量〉

1日量3包(9g)中に薏苡仁湯乾燥エキスが4.4g含まれています。

マオウ	4.0g
トウキ	4.0g
ビャクジュツ	4.0g
ヨクイニン	8.0g
ケイヒ	3.0g
シャクヤク	3.0g
カンゾウ	2.0g

より抽出。

添加物として乳糖、セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

## 〈効能・効果〉

筋肉痛、関節痛

## 〈用法・用量〉

次の1回量を1日3回、食前又は食間、なるべく空腹時に服用して下さい。

食間とは…食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量
15歳以上	1包
7～14歳	2/3包
4～ 6歳	1/2包
2～ 3歳	1/3包
2歳未満	服用しないこと

### 用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

※本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、原料の相違により、顆粒の色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号