

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみに

漢方製剤
ニタンダ

ろく み がん
六味丸

第2類医薬品

「ニタンダ六味丸」は、漢方処方「六味丸（六味地黄丸）」に基づいて作られている漢方製剤です。漢方処方「六味丸」は漢方医学でいう“腎”の機能系に障害がおこった時、これを補強する働きがあります。“腎”とは、現代医学でいう腎臓、副腎、生殖器、膀胱などの泌尿器系を広く総称しているものです。

“腎”の機能障害は、小児から大人までおこりますが、特に加齢によってその働きが衰える器官といわれており、高年齢になるほど“腎”の機能障害はおこりやすくなるといえます。

「ニタンダ六味丸」は、“腎”の機能障害によって、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渇がある方に用いられます。症状としては、尿がすっきり出ない、残尿感がある、夜間たびたび尿意を催す、尿の回数が多い、むくみがある、皮膚がカサカサしてかゆい、などに適応し、小児から大人まで広く用いることができます。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<成分・分量>

1日量60丸中

成 分	60丸中	基 原
ジオウ末	1.92g	Rehmanniae Radix ゴマンノハグサ科。アカヤジオウ又はその近縁植物の根又はそれを蒸したものを。
サンシュユ末	0.96g	Corni Fructus ミズキ科。サンシュユの偽果の果肉。
サンヤク末	0.96g	Dioscoreae Rhizoma ヤマイモ科。ヤマノイモ又はナガイモの周皮を除いた根茎。
タクシャ末	0.72g	Alismatis Rhizoma オモダカ科。サジオモダカの塊茎で通例、周皮を除いたものを。
ブクリョウ末	0.72g	Poria サルノコシカケ科。マツホドの菌核。
ボタンピ末	0.72g	Moutan Cortex ボタン科。ボタンの根皮。

添加物として、ハチミツ、アルファー化デンプン、セラックを含有する。

<効能・効果>

体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渇があるものの次の諸症：

排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ

<用法・用量>

次の1回量を1日3回、食前又は食間、なるべく空腹時に服用して下さい。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
成 人（15歳以上）	20 丸
7～14歳	13 丸
4～6歳	10 丸
4歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 4歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号