

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。  
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

# ニタンダ ヨクイニン錠

第3類医薬品

ニタンダヨクイニン錠は、イボとり、肌あれの薬として古くから用いられてきた生薬ヨクイニン（イネ科の植物ハトムギの種皮をのぞいた種子）を煎じて得たエキスに賦形剤（乳糖、でんぷん等）を加えてのみやすい錠剤としたものです。



## 使用上の注意

### \* 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 〈効能・効果〉

いぼ、皮膚のあれ

いぼ …………… とくに若年の人にできる、だんだん広がっていくいぼによく効き、多くは1カ月くらいで消えてなくなります。

皮膚のあれ …… 皮膚の栄養補給に役立ち、カサカサの肌、吹き出もの出やすい皮膚が、つやのあるなめらかな肌になります。

## 〈用法・用量〉

次の量を、1日3回食前又は食間に服用して下さい。 食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年齢	1回量
成人（15歳以上）	4錠
11～14歳	3錠
7～10歳	2錠
5～6歳	1錠
5歳未満	服用しないこと

## 用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 〈成分・分量〉

1日量12錠中

ヨクイニンエキス……………990mg

添加物として乳糖、セルロース、トウモロコシデンプン、  
ステアリン酸マグネシウム、ビタミンCを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

※本剤は天然物（ヨクイニン）のエキスを用いていますので、原料の相違により、錠剤の色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号