

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

総合かぜ薬

非ピリン系

葛根湯配合の ^{ササ} ^{トラ} 笹虎エース

第②類医薬品

笹虎エースは、漢方のかぜ薬としてよく知られている“葛根湯”に、非ピリン系解熱鎮痛剤、鎮咳去痰剤、抗ヒスタミン剤などを配合した総合かぜ薬です。



使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- 次の人は服用しないで下さい。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
（眠気等があらわれることがあります。）
（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）
- 服用前後は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人：高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈成分と作用〉 1日量3包(6g)中

成分	3包中	作用
葛根湯エキス カクコン 2.66667g マオウ 1.33333g タイソウ 1.33333g ケイヒ 1.00000g シャクヤク 1.00000g カンゾウ 0.66667g ショウキョウ 0.33333g	1446.7mg	葛根湯は、漢方のかぜ薬としてよく用いられている処方で、かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・節々の痛み等の症状をおさえます。
アセトアミノフェン	330.0mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
エテンザミド	450.0mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
チペピジンヒベンズ酸塩	75.0mg	せきをしずめ、たんをきります。
無水カフェイン	90.0mg	頭痛をしずめます。

添加物としてトウモロコシデンプン、炭酸カルシウム、乳糖を含有する。

〈効能・効果〉 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

〈用法・用量〉 次の1回量を食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11～14歳	2/3包	
7～10歳	1/2包	
3～6歳	1/3包	
1～2歳	1/4包	
1歳未満	服用しないこと	

用法・用量についての注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号